

Liite 2 Ivalojoen suiston Natura-alueen lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut. Lajien kuvaukset on esitetty Ivalojoen suistoalueen linnusto (Osmonen ja Karhu 2002) ja Inarijärven linnusto (Leppänen ym. 2007) -raporttien mukaan.

*Haapana* pesii suiston alueella (10–20 paria) ja se kuuluu suiston runsaimpiin pesimälajeihin (Osmonen ja Karhu 2002). Heinätavi pesii myös Inarijärvellä (51–100 paria) (Leppänen ym. 2007).

*Harmaalokki* on Inarin Lapissa hyvin harvinainen pesimälintu. Muuttavia ja kierteleviä yksilöitä nähdään melko yleisesti sekä suistoalueella että Mielikköjängällä (Osmonen ja Karhu 2002).

*Harmaasieppo* pesii suiston alueella (1–5 paria) (Osmonen ja Karhu 2002).

*Heinätavi* pesii todennäköisesti lähes vuosittain jokisuistossa (2–3 paria). (Osmonen ja Karhu 2002). Laji pesii Inarijärvellä, (1–5 paria, ei pesimäaikaista havaintoja saaristosta) (Leppänen ym. 2007).

*Isokoskelo* pesii suiston alueella (1–5 paria). Kevätaikaan havaitut suurimmat yksilömäärät ovat 30–50. (Osmonen ja Karhu 2002). Isokoskelo pesii myös Inarijärvellä (101–500 paria) (Leppänen ym. 2007).

*Isokuovi* on useina vuosina pesinyt suiston alueella (2–3 paria) (Osmonen ja Karhu 2002). Laji pesii Inarijärvellä (1–5 paria, ei pesimäaikaista havaintoja saaristosta) (Leppänen ym. 2007).

*Jouhisorsa* pesii suiston alueella (1–2 paria). kevätaikaan havaitut suurimmat yksilömäärät ovat 8–40 (Osmonen ja Karhu 2002). Jouhisorsa pesii myös Inarijärvellä (1–10 paria) (Leppänen 2007).

*Jänkäkurpan* pesivä kanta rajoittuu Mielikköjängän märimpiin osiin (Osmonen ja Karhu 2002). Laji pesii myös Inarijärvellä (1–10 paria) (Leppänen ym. 2007).

*Jänkäsirriäinen* esiintyy Mielikköjärven etelä- ja lounaisreunan neva-alueella (Osmonen ja Karhu 2002). Laji pesii myös Inarijärvellä (1–5 paria) (Leppänen ym. 2007).

*Järripeppo* pesii suiston alueella (20–50 paria) (Osmonen ja Karhu 2002). Laji pesii myös Inarijärvellä (5001–10000 paria) (Leppänen ym. 2007).

*Kalalokki* pesii suiston alueella (0–2 paria) (Osmonen ja Karhu 2002). Laji pesii myös Inarijärvellä (101–500 paria) (Leppänen ym. 2007).

*Keltavästäräkki* pesii suiston alueella (5–10 paria, enin osa Mielikköjängällä). Suurin havaittu muuttoparvi 30 yksilöä (Osmonen ja Karhu 2002). Laji pesii myös Inarijärvellä (101–500 paria) (Leppänen ym. 2007).

*Kirjosieppo* pesii suiston alueella (2–3 paria) (Osmonen ja karhu 2002). Kirjosieppo pesii myös Inarijärvellä (101–500 paria) (Leppänen ym. 2007).

*Kiuru* pesii suiston alueella (1–3 paria) (Osmonen ja Karhu 2002). Laji pesii myös Inarijärvellä (1–5 paria, havaintoja vain kylätaajamista) (Leppänen ym. 2007).

*Kivitasku* pesii suiston alueella (1–3 paria) (Osmonen ja Karhu 2002). Laji pesii myös Inarijärvellä (101–500 paria) (Leppänen ym. 2007).

*Käki* pesii suiston alueella (1–3 paria) (Osmonen ja Karhu 2002). Laji pesii myös Inarijärvellä (11–50 paria) (Leppänen ym. 2007).

*Lapasorsa* pesii suiston alueella (3–5 paria) (Osmonen ja Karhu 2002). Laji pesii myös Inarijärvellä (1–5 paria, ei pesimääkaikaisia havaintoja saaristosta) (Leppänen ym. 2007).

*Lapasotkaa* tavataan kevätmuutolla muutamia yksilöitä, ei kuitenkaan vuosittain (Osmonen ja Karhu 2002) sekä samoin Inarijärvellä muutolla (Leppänen ym. 2008).

*Lapinkirvistä* tavataan kevätmuutolla melko harvoin, syysmuutolla hieman useammin (Osmonen ja Karhu; Leppänen ym. 2007).

*Lapinsirkkua* havaitaan vuosittain kevätmuutolla levähtäviä pikkuparvia (Osmonen ja Karhu 2002). Laji on myös melko yleinen muutolla Inarijärvellä (Leppänen ym. 2007).

*Lapinsirri* on läpimuuttajana melko harvinainen tai harvinainen (Osmonen ja Karhu 2002). Laji pesii Inarijärvellä (101–500 paria) (Leppänen ym. 2007).

*Leppälintu* pesii suistoalueella suoalueiden välissä olevissa kangasmetsän saarekkeissa (3–5 paria) (Osmonen ja Karhu 2002). Laji pesii myös Inarijärvellä (1001–5000 paria) (Leppänen ym. 2007).

*Lyhytnokkahanhea* on havaittu harvoin metsähanhiparvissa kevätmuuton aikaan (Osmonen ja Karhu 2002). Laji on havaittu harvoin muuton aikaan Inarijärvellä (Leppänen ym. 2007).

*Merilokkia* havaitaan kierteleviä yksilöitä säännöllisesti sekä jokisuistossa että Mielikköjängällä (Osmonen ja Karhu 2002). Laji pesii Inarijärvellä (1–5 paria) (Leppänen ym. 2007).

*Metsähanhea* havaitaan vuosittain kevätmuutolla yhteensä noin 50–100 yksilöä, Mielikköjärvien ympäristössä ja jokisuiston alaosan luhtaniityllä. Suurimmat havaitut määrät ovat 20–26 yksilöä (Osmonen ja Karhu 2002). Laji pesii Inarijärvellä (1–10 paria) (Leppänen ym. 2007).

*Metsäkirvinen* pesii suiston alueella (0–2 paria) (Osmonen ja Karhu 2002). Laji pesii Inarijärvellä (51–100 paria) (Leppänen ym. 2007).

*Mustalintua* tavataan vuosittain kevätmuutolla muutama yksilö (Osmonen ja Karhu 2002). Laji pesii Inarijärvellä (11–50 paria) (Leppänen ym. 2008).

*Mustavikloa* pesii Mielikköjängällä yksi pari (2–3 paria). Suurin havaittu määrä muuton aikaan jokisuistossa on 12 paria (Osmonen ja Karhu 2002). Laji pesii Inarijärvellä (11–50 paria) (Leppänen ym. 2008).

*Naurulokkia* esiintyy jokisuistoon kevätmuuton aikaan, jolloin niitä kertyy sinne joskus jopa satamäärin. Laji pesii suiston alueella (10–20 pari). Pesintä kuitenkin onnistuu vain harvoin Inarijärven säännöstelyn vuoksi (Osmonen ja Karhu 2002). Laji pesii Inarijärvellä (1–10 paria) (Leppänen ym. 2007).

*Niittykirvinen* pesii suiston alueella (30–50 paria). Enin osa kannasta pesii Mielikköjängällä. Jokisuiston luhtaniityillä pesintä ei ilmeisesti onnistu kevättulvan vuoksi (Osmonen ja Karhu 2002). Laji pesii Inarijärvellä (101–500 paria) (Leppänen ym. 2007).

*Pajulintu* pesii suiston alueella (50–100 paria) (Osmonen ja Karhu 2002) ja Inarijärvellä (5001–10000 paria) (Leppänen ym. 2007).

*Pajusirkku* pesii suiston alueella (20–30 paria) (Osmonen ja Karhu 2002) sekä Inarijärvellä (51–100 paria) (Leppänen ym. 2007).

*Pensastasku* esiintyy Inarin Lapissa melko harvalukuisena, mutta säännöllisesti. Pesi suiston alueella (3–5 paria) (Osmonen ja Karhu 2002). Laji pesii myös Inarijärvellä (11–50 paria) (Leppänen ym. 2007).

*Piekana* pesii myyrävuosina suistoalueen ympärillä olevilla vaaroilla vähintään 5–6 paria, joiden reviirit ulottuvat suistoalueelle (Osmonen ja Karhu 2002). Laji pesii myös Inarijärvellä (11–50 paria) (Leppänen ym. 2007).

*Pikkukuovi* pesii suiston alueella (2–3 paria) (Osmonen ja Karhu 2002). Laji pesii myös Inarijärvellä (11–50 paria) (Leppänen ym. 2007).

*Pikkusirkku* pesii suiston alueella (1–3 paria) (Osmonen ja Karhu 2002). Laji pesii myös Inarijärvellä (1–5 paria) (Leppänen ym. 2007).

*Punakylkirastas* pesii suiston alueella (20–30 paria) (Osmonen ja Karhu 2002). Pesii myös Inarijärvellä (501–1000 paria) (Leppänen ym. 2007).

*Rantasipi* pesii suiston alueella (2–3 paria) (Osmonen ja Karhu 2002). Pesii myös Inarijärvellä (101–500 paria) (Leppänen ym. 2007).

*Ruokokerttunen* pesii suiston alueella (8–12 paria) (Osmonen ja Karhu 2002). Laji pesii myös Inarijärvellä (1–10 paria, ei pesimäaikaista havaintoja saaristosta) (Leppänen ym. 2007).

*Räkättirastas* pesii suiston alueella (5–10 paria) (Osmonen ja Karhu 2002). Laji pesii myös Inarijärvellä (101–500) (Leppänen ym. 2007).

*Sinisorsa* pesii suiston alueella (6–10 paria) (Osmonen ja Karhu 2002). Kevätaikaan havaitut suurimmat yksilömäärät Ivalojoen suulla ovat 6–15. Laji pesii myös Inarijärvellä (11–50 paria) (Leppänen ym. 2007).

*Suosirri* on melko harvinainen läpimuuttaja (Osmonen ja Karhu 2002; Leppänen ym. 2007).

*Taivaanvuohi* pesii suiston alueella (10–20 paria), enin osa Mielikköjärgällä. Taivaanvuohi on Ivalojoen suiston yleisempiä kahlaajia (Osmonen ja Karhu 2002). Laji pesii Inarijärvellä (51–100 paria) (Leppänen ym. 2007).

*Tavi* on suiston runsaimpia pesimälintuja (11–20 paria) (Osmonen ja Karhu 2002). Kevätaikaan havaitut suurimmat yksilömäärät Ivalojoen suulla ovat 10–70. Laji pesii myös Inarijärvellä (51–100 paria) (Leppänen ym. 2007).

*Telkkä* pesii suiston alueella (20–25 paria) (Osmonen ja Karhu 2002). Kevätaikaan havaitut suurimmat yksilömäärät Ivalojoen suulla on 30. Laji pesii myös Inarijärvellä (101–500 paria) (Leppänen ym. 2007).

*Tukkaskoskelo* pesii suiston alueella (1–5 paria) (Osmonen ja Karhu 2002). Kevätaikaan havaitut suurimmat yksilömäärät Ivalojoen suulla ovat 10–25. Laji pesii myös Inarijärvellä (101–500 paria) (Leppänen ym. 2007).

*Tukkasotka* pesii suiston alueella (30–40 paria). Laji on runsaimpia pesimälajeja vesilinnuista (Osmonen ja Karhu 2002). Laji pesii myös Inarijärvellä (51–100 paria) (Leppänen ym. 2007).

*Tuulihaukkaa* tavataan enimmillään muutama yksilö lähes vuosittain kevätaikaan. Pesintä jokisuiston alueella on mahdollista myyrävuosina (Osmonen ja Karhu 2002). Laji pesii Inarijärvellä (1–5 paria) (Leppänen ym. 2007).

*Törmäpääsky* pesii suiston alueella (50–100 paria) jyrkässä rantatörmässä Nirvamellan länsirannalla. Pesätörmä on vuosi vuodelta madaltunut (Osmonen ja Karhu 2002). Laji pesii Inarijärvellä (51–100 paria) (Leppänen ym. 2007).

*Töyhtöhyppä* pesii suiston alueella (0–3 paria) (Osmonen ja Karhu 2002). Töyhtöhyppää tavataan muutamia muuton aikaan Ivalojoen suulla, laji pesii Mielikköjängällä (Leppänen ym. 2007).

*Valkoviklo* pesii Mielikköjängällä (1–2 paria) (Osmonen ja Karhu 2002). Laji pesii myös Inarijärvellä (51–100 paria) (Leppänen ym. 2007).

*Västaräkki* pesii suiston alueella (3–5 paria) (Osmonen ja Karhu 2002). Laji pesii myös Inarijärvellä (51–100) (Leppänen ym. 2007).